

MISSTANKE OM STREPTOKOCKEPIDEMI I DAGHEMSGRUPPEN

Streptokock A-infektioner är vanliga bland småbarn.

Om det i gruppen:

- Inom de två senaste veckorna konstaterats streptokock A-infektioner (svalginfektion, scharlakansfeber, hudinflammation kring ändtarmsöppningen) hos ≥ 20 procent
- ➔ fyll i blanketten nedan gällande gruppen och skicka den per e-post till enheten för bekämpning av infektioner (infektioidentorjunta@luvn.fi).

Daghemmets namn:

Daghemmets adress:

Daghemmsgruppens namn:

Antal barn och åldersfördelning i gruppen:

Antal vuxna i gruppen:

Laboratoriebekräftade streptokockinfektioner inom de två senaste veckorna _____ - _____:

- Barn:
- Vuxna:

Gemensam toalett med en annan daghemmsgrupp, gruppens namn och huruvida streptokockinfektioner konstaterats i gruppen under de två föregående veckorna:

Måltider i samma utrymme som en annan daghemmsgrupp, gruppens namn och huruvida streptokockinfektioner konstaterats i gruppen under de två föregående veckorna:

Namn och kontaktuppgifter till daghemmets kontaktperson (e-post och telefonnummer):

Om laboratoriebekräftade infektionerna i samma grupp överstiger 20% inom de senaste två veckorna, överväger smittskyddsenheten från fall till fall att testa resten av barngruppen.