

Kihomadot

- Kihomadot aiheuttavat peräaukon kutinaa. Tartunta voi olla myös oireeton.
- Todettu kihomatotartunta hoidetaan matolääkkeellä. Matolääkettä voi ostaa apteekista ilman reseptiä (esim. Pyrvin®) tai lääkärin reseptillä (Vermox®).
 - Kaikki sairastuneen kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt hoidetaan, myös oireettomat aikuiset.
 - **Hoito uusitaan 2 viikon kuluttua vain niille, joilla kihomatoja oli todettu.** Lue lääkevalmisteen pakkausseloste.
- Lapsi voi olla päiväkodissa tai koulussa normaalisti. Tartunnasta suositellaan kertomaan henkilökunnalle, jotta tartunnan mahdollisuudesta voidaan tiedottaa muita huoltajia.

Tartunnan ehkäisy

- Pidä sormenkynnet lyhyinä.
- Pese kädet vedellä ja saippualla ennen ja jälkeen ruokailun, sekä wc-käynnin jälkeen. Älä syö sormin.
- Siivoa huolellisesti lääkkeen ottamisen jälkeisenä päivänä:
 - Pese liinavaatteet, pyyhkeet, yöpuvut, pehmolelut ja muut lelut. Laita ne pesukoneeseen. Älä ravista niitä.
 - Vaihda alushousut aamuin illoin viikon ajan, jos mahdollista. Laita käytetyt alushousut suoraan pesuun tai säilytä ne ennen pesua muovipussissa.
 - Imuroi lattiat, patjat ja tyynyt huolellisesti sekä pyyhi pinnat.
 - Siivoa WC-tilat huolellisesti, erityisesti ovenkahva, vetonuppi, pöntön istuinrenkas ja hana.
 - Muista myös käsipyyhkeiden vaihto päivittäin hoidon ajan.
- **Toista siivous kahden viikon kuluttua toisen lääkehoidon yhteydessä.**