

Springmask

- Springmask orsakar klåda kring ändtarmsöppningen. Kan även vara symtomfri.
- Sköts med läkemedel som kan köpas på apoteket receptfritt (till exempel Pyrvin®) eller med läkarrecept (Vermox®).
 - Behandla hela familjen samtidigt, även symtomfria vuxna.
 - **Behandlingen upprepas efter 2 veckor, endast för de som haft springmask.** Följ anvisningarna i bipacksedeln.
- Barnet kan vara i daghemmet eller skolan som vanligt. Vi rekommenderar att dagvårdspersonalen informeras om smittan så att de övriga vårdnadshavarna kan informeras om möjlig smitta.

Förebyggande av smitta

- Håll naglarna korta.
- Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter måltider samt efter wc-besök. Ät inte med fingrarna.
- Tvätta noggrant följande dag efter att läkemedlet tagits:
 - Tvätta sängkläder, handdukar, pyjamas/nattlinne, mjukisdjur och andra leksaker. Sätt dem i tvättmaskinen utan att skaka dem.
 - Byt underkläder morgon och kväll under en veckas tid, om möjligt. Sätt genast de använda underkläderna i tvätten eller förvara dem i en plastpåse tills de tvättas.
 - Dammsug golven, madrasser och dynorna noggrant, putsa ytorna.
 - Rengör WC-utrymmen, speciellt dörrhandtaget, spolknappen, toaletsitsen och kranen.
 - Kom även ihåg att byta handdukar dagligen under behandlingen.
- **Städa på nytt efter att det gått två veckor, i samband med den andra läkemedelsbehandlingen.**