Gonorré patientanvisning

Gonorré är en inflammation som orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Sjukdomen sprids sexuellt. Gonorré smittar via oskyddad sexkontakt; vaginal- och analsex samt oralsex. Gonorrébakterien kan också hamna i ögonen via händerna. Även symptomfri gonorré smittar.

Symtom på gonorré

Gonorré är ofta symtomfri eller mycket lindrig i de tidiga stadierna. Hos kvinnor är typiska symtom ökad vitflytning, urineringsproblem och smärta i nedre delen av buken. Obehandlad gonorré kan orsaka äggledarinflammation (salpingit). Hos män kan symtomen vara sveda vid urinering, ökat urineringsbehov och gulaktig flytning från urinröret. Obehandlad gonorré kan orsaka prostatainflammation och bitestikelinflammation (epididymit). Vid smitta i svalgen kan symtomen vara halsont och svidande känsla i munnen, vid ögonsmitta ögonrodnad och variga ögon, vid tarmsmitta sveda och slembildning från ändtarmen.

Hur konstateras och behandlas gonorré?

Gonorré konstateras med ett prov som tas tidigast 5 dygn efter smittillfället. Provet tas från urinen, slidan eller livmoderhalsen (hos kvinnor) eller från ett annat ställe beroende på samlagssätt. Före urinprovet ska du låta bli att urinera i minst 2 timmar.

Gonorré behandlas beroende på orten antingen på hälsostationen eller på HUS poliklinik för könssjukdomar (Hud- och allergisjukhuset, Mejlansvägen 2, 00250 Helsingfors), dit läkaren skriver en remiss. Gonorré behandlas alltid med antibiotika.

Hur förhindrar man att gonorré smittar?

Oskyddat sex ska undvikas tills kontrollproven har visat negativa resultat. Kondom/skydd vid oralsex ska användas fram till dess. Datum för kontrollprov (tidigast): _____.
För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att även patientens partner behandlas.

För att förebygga gonorrésmitta vid tillfälliga sexkontakter rekommenderas användning av kondom/oralskydd.

Anvisningar för personer som kommer till laboratoriet - Urinprov för undersökning av klamydia och gonorré

Undvik att urinera eller tvätta underlivet i minst 2 timmar innan du lämnar provet. Provet tas i början av urinstrålen (från första droppen). Du får en urinprovsbehållare från HUSLABs närmaste verksamhetsställe. Urinprovsbehållaren är en provburk med lock (120 ml). Provtagaren markerar en linje över vilken urin inte får hällas i burken.

Urinprovtagning:
1) Tvätta inte underlivet
2) Samla urin från första droppen i insamlingskärlet, högst upp till den markerade linjen som provtagaren har gjort (20–30 ml). Du kan låta resten av urinen rinna i toalettskålen.

Efter provtagningen:
Fäst på urinprovskärlet en etikett med ditt namn, din personbeteckning och tidpunkten för när du gav urinprovet. Laboratoriet undersöker inte prover med bristfälliga markeringar.

Lämna in provkärlet till laboratoriet inom ett dygn, förvara det i rumstemperatur. Om du har varit tvungen att avvika från anvisningarna, berätta om detta för provtagaren.

Om du har några frågor om provtagningen kan du ringa HUSLABs servicenummer, tfn 09 471 86800 mån–fre kl. 7.30–15.30. Det är tyvärr inte möjligt att ge laboratorieresultat på servicenumret. Du får resultatet av parten som behandlar dig.